

ご使用に際して、この説明書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

第2類医薬品

複合胃腸薬

胃の不快感に12の成分が効く ホシ胃腸薬 ホリン グリーン 胃粘膜修復剤配合

特長

ホシ胃腸薬 ホリン グリーンは制酸剤、健胃剤、消化剤及び胃粘膜修復剤の12成分がそれぞれの特長を生かして配合された複合胃腸薬で、胃腸の不快感によく効きます。

- 1 制酸剤として速効性と持続性のタイプの異なる3つの成分の、それぞれの特長を生かした配合により、胃内の酸度を正常に保ち、胃酸過多等による胃の不快感によく効きます。
- 2 健胃剤として「オウレン末」、「ガジュツ末」など6つの生薬の、それぞれの特長を生かした配合により、弱った胃腸の働きを助けて胃の不快感によく効きます。
- 3 複合消化酵素「ビオチアスターゼ2000」の配合により、消化不良による胃や腸の不快感によく効きます。
- 4 胃粘膜修復剤「銅クロロフィリンナトリウム」、「カンゾウ末」の配合により、傷ついた胃粘膜を修復・保護し、他の成分と共に働いてこれらの作用を高めます。



使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないで下さい
透析療法を受けている人
2. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の診断を受けた人
腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい
便秘、下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

効能・効果

- 胃痛、胃酸過多、胸やけ、胃重、胃部不快感、げっぷ、はきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、嘔吐
- 胃弱、もたれ(胃もたれ)、食欲不振(食欲減退)、胸つかえ、飲み過ぎ
- 消化促進、消化不良、食べ過ぎ、消化不良による胃部・腹部膨満感

用法・用量

下記の1回服用量を食間又は食後に服用して下さい。

年齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
11歳以上 15歳未満	2/3包	
8歳以上 11歳未満	1/2包	
5歳以上 8歳未満	1/3包	
5歳未満の乳幼児	服用しないで下さい。	

(用法・用量に関連する注意)

1. 用法・用量を厳守して下さい。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

成分・分量 1日量3包中

成分	分量	作用
炭酸水素ナトリウム	1200mg	速効性で速やかに胃酸を中和します。
沈降炭酸カルシウム	750mg	非吸収性で速やかに胃酸を中和します。
メタケイ酸アルミン酸 マグネシウム	735mg	非吸収性でガスを発生しません。持続的に胃内pHを調節して、胃粘膜を被覆・保護します。
オウレン末	90mg	胃の過度の運動を抑制して、胸つかえや食欲不振などを改善します。
ゲンチアナ末	90mg	胃液や胆汁の分泌促進作用があり、食欲を増進します。
ガジュツ末	90mg	胃液分泌抑制作用や胆汁分泌促進作用があり、胃弱や胃もたれなどを改善します。
ケイヒ末	120mg	弱った胃の運動を活発にして、食欲不振や消化不良などを改善します。
ショウキョウ末	60mg	胃の過度の運動を抑制して、胃痛やむかつきなどを改善し消化を促進します。
チョウジ末	30mg	胃の過度の運動を抑制して、胃痛やはきけ・嘔吐などを改善します。
ビオチンアスターゼ2000	75mg	複合消化酵素で消化を促進して、消化不良による諸症状を改善します。
銅クロロフィリンナトリウム	45mg	クロロフィル誘導体で、胃壁のただれや傷ついた胃粘膜の修復を促進します。
カンゾウ末	315mg	胃の過度の運動や胃液の分泌を抑制して、傷ついた胃粘膜の修復を促進します。

添加物として、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。

(成分・分量に関連する注意)

本剤中に含まれる銅クロロフィリンナトリウムにより、服用後に一時的に便が緑色になることがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- 星製薬株式会社 ☎0120-179-033

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **Hoshi** 星製薬株式会社

東京都品川区西五反田7丁目22番17号